

Godello



Ampelografía

Sumidad:

Apertura extremidad Completamente abierta

Pelos postrados de la extremidad Pigmentación media
Densidad media

Pámpano:

Color entrenudo Verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Color nudo Verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Densidad pelos tumbados Nula o muy baja en nudo
Nula o muy baja en entrenudo

Hoja joven:

Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales Nula o muy débil

Densidad pelos tumbados Débil entre nervios
Débil sobre nervios

Hoja adulta:

Tamaño del limbo Mediano-grande

Forma del limbo Pentagonal

Número de lóbulos Cinco

Disposición lóbulos del seno peciolar Abierto

Hinchazón del haz Media

Perfil en sección transversal Plano con bordes hacia el envés

Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores Profundidad superficial con lóbulos abiertos



Pigmentación del haz Débil

Densidad pelos tumbados entre nervios principales Baja

Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales Media-densa

Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo Peciolo más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados

Forma y longitud de dientes Dientes con ambos lados convexos de longitud medios con relación longitud-anchura mediana



Racimo:

Tamaño Pequeño-mediano

Compacidad Compacto

Longitud pedúnculo Medio-corto

Baya:

Tamaño Pequeña

Uniformidad tamaño Uniforme

Color Epidermis Verde amarilla

Forma de perfil Elíptica ancha

Separación pedicelo Difícil

Grosor piel Media-gruesa

Pigmentación pulpa Ausente o muy débil

Consistencia pulpa Ligeramente dura

Suculencia pulpa Muy jugosa

Sabores particulares Ninguno

Formación pepitas Bien formadas

Sarmiento:

Color Marrón amarillento/
Marrón oscuro

Relieve superficie Lisa

Fenología:

Época de desborre: precoz

Época de maduración: muy precoz

Aptitudes agronómicas:

- Vigor medio alto, porte erguido.
- Fertilidad elevada, más productiva que Albariño.
- Poda media. Terreno seco.
- Muy poco sensible a botrytis, sensibilidad media al mildiu y excoriosis y sensible a oídio.

Potencial enológico:

- Vinos varietales, alcohólicos y acidez total media elevada.
- Calidad global enológica: muy buena.

