

Xarello

Sinonimias: Cartoixa. Pansa blanca. Pansal. Xarel.lo.



Ampelografía

Sumidad:

Apertura extremidad	Completamente abierta
Pelos postrados de la extremidad	Pigmentación media-alta Densidad alta

Pámpano:

Color entrenudo	Verde con rayas rojas en la cara dorsal verde en la cara ventral
Color nudo	Verde-verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral


Densidad pelos tumbados	Baja en nudos Baja en el entrenudos
-------------------------	----------------------------------------

Hoja joven:


Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales	Nula o muy débil
Densidad pelos tumbados	Densa entre nervios Media sobre nervios

Hoja adulta:

Tamaño del limbo	Grande-muy grande
Forma del limbo	Pentagonal
Número de lóbulos	Cinco
Disposición lóbulos del seno peciolar	Poco abierto-ligeramente superpuestos
Hinchazón del haz	Medio
Perfil en sección transversal	Bordes hacia el envés
Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores	Profundidad superficial con lóbulos abiertos
Pigmentación del haz	Ausente o muy débil
Densidad pelos tumbados entre nervios principales	Baja
Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales	Baja
Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo	Peciolo ligeramente más corto que el nervio central, con densidad baja
Forma y longitud de dientes	Dientes rectilíneos-convexos de longitud medios y con relación longitud-anchura mediana



Xarello



Racimo:

Tamaño	Mediano
Compacidad	Compacto
Longitud pedúnculo	Muy corto

Baya:

Tamaño	Media
Uniformidad tamaño	Uniforme
Color Epidermis	Verde amarilla
Forma de perfil	Circular
Separación pedicelo	Difícil
Grosor piel	Gruesa
Pigmentación pulpa	Ausente o muy débil
Consistencia pulpa	Ligeramente dura
Suculencia pulpa	Ligeramente jugosa-muy jugosa
Sabores particulares	Ninguno
Formación pepitas	Bien formadas

Sarmiento:

Color	Marrón oscuro
Relieve superficie	Estriada

Fenología:

Época de desborre: media
Época de maduración: media

Aptitudes agronómicas:

- Variedad rústica de mediano vigor. Se adapta bien a todos los suelos.
- Yemas de la base poco productivas. Se recomienda poda larga.
- Sensible al corrimiento. Productividad buena con condiciones climáticas favorables durante la floración.
- Sensible al oídio, mildiu, ácaros y polillas del racimo. Poco sensible a botrytis.

Potencial enológico:

- Mostos de elevada acidez, con un contenido en azúcares medio-alto, muy apreciado en la elaboración de cavas, consistente y equilibrado.

