

Selección Oppenheim del Teleki n.º 4

S04

Aptitudes culturales:

- Este patrón se ha ido imponiendo en los últimos tiempos en muchas zonas vitícolas porque confiere a los injertos un desarrollo, una entrada en producción muy rápida y un gran vigor, que es capaz de mantener durante la vida de la plantación, teniendo en cuenta que además favorece la fructificación y adelanta la maduración.
- Es bastante resistente a contenidos elevados de caliza en el suelo, aunque a veces se indica que no es superior al 110 R, adaptándose muy bien en terrenos con subsuelo fresco y húmedo, pero el comportamiento en suelos secos es bastante malo.
- Es sensible a la carencia de magnesio y tiende a agravar los problemas de desecación del raspón.
- Es resistente a los nematodos (*Meloidogyne* sp.).
- Sus campos de pies madres producen mucha madera que enraíza bien. Responde adecuadamente al injerto en campo aunque el de taller no va excesivamente mal.
- En Francia y zonas frescas ha sido considerado como el portainjerto más importante, pero su excesivo vigor, la producción de vinos de calidad mediocre y los problemas de desecación del raspón le convierten en un portainjerto pasado de moda.





Ampelografía:

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Ligeramente abierto
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación nula o muy débil Densidad débil-media

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Rojo en la cara dorsal Rojo en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy baja en nudos Nula o muy baja en entrenudos



Hoja joven:

<i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i>	Nula o muy débil
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy baja entre nervios Nula o muy baja sobre nervios

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Grande
<i>Forma del limbo</i>	Deltoide
<i>Número de lóbulos</i>	Tres
<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Medio abierto
<i>Hinchazón del haz</i>	Media
<i>Perfil en sección transversal</i>	Forma de V
<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad estre muy superficial-superficial con lóbulos abiertos
<i>Pigmentación del haz</i>	Débil
<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Nula o muy baja entre nervios del envés
<i>Densidad pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Media sobre nervios del envés
<i>Longitud y densidad de pelos sobre el pecíolo</i>	Pecíolo más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados
<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes a ambos lados rectilíneos de longitud medios y con relación longitud-anchura mediana

Hoja adulta:

<i>Color</i>	Marrón rojizo
<i>Relieve superficie</i>	Estriado